GLYPHODES JACULALIS,

NIEUWE SOORT DER PYRALIDEN,

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

In de Reis door Midden-Sumatra heb ik in de opnoeming der Lepidoptera, welke in 1880 het licht zag, op p. 68 eene nieuwe soort van *Glyphodes*, onder den naam van *Piepersialis* beschreven, die in deel XXVI (1883) van het *Tijdschr. voor Entomologie* op p. 143 op nieuw is vermeld (van Celebes) en aldaar op pl. 8, fig. 11, is afgebeeld. Op de laatst aangehaalde plaats zeide ik, dat ik ook nog eene aan *Piepersialis* verwante *Glyphodes* van de Philippijnsche eilanden bezat, die zich onderscheidde door anders gevormde tweede witte voorrandsvlek der voorvleugels. Misschien is zij dezelfde, die de heer Moore in de *Lep. of Ceylon*, p. 323, pl. 180, f. 4, later (in 1886) onder den naam van *Itysalis* heeft gepubliceerd en die ook dezelfde zou zijn als de *Itysalis* van Walker; maar diens beschrijving is zóó oppervlakkig, dat zij op eene geheele reeks van verwante soorten past, zooals b. v. de heer Meyrick er eene in de *Trans. Ent. Soc. of London* 1884, p. 298, uit Australië heeft beschreven als *Glyph. excelsalis*. Het best is dus, om Moore als auteur van *Itysalis* te laten gelden. Ik kan evenwel thans niet uitmaken, of deze soort dezelfde is als mijne bovenvermelde *Glyphodes* van de Philippijnen.

Behalve de twee (of drie) bovengenoemde, na verwante soorten, heb ik er nog eene leeren kennen van Java — waar intusschen *Piepersialis* voor eenige jaren door Mr. Piepers ook is ontdekt. De heer Piepers zond van die nieuwe soort in 1889 een zeer gaven

en frisschen man, op West-Java, in de Preanger gevangen. Ik zou deze soort, die ik *jaculalis* noem, nog wel onbeschreven gelaten hebben, ware het niet dat ik onlangs een tweede exemplaar, mede een ♂ en wellicht ook van Java, voor iemand met mijn' collectie-naam determineerde en dus beter vind haar nu te publiceeren.

De vlucht der beide exemplaren is 27 en 29 mm. en de grootte dus ongeveer als *Piepersialis*, die in dit opzicht variëert, want Mr. Lucassen zond een Javaansch ♀ (Tegal) van niet meer dan 23 mm. vlucht. Palpen buitenwaarts grauwbruin, met witten onder- en bovenrand. Zij zijn tweemaal zoo lang als de kop, iets langer en spitser dan bij *Piepersialis*. Sprieten bruingrauw, iets lichter geringd, de wortel vuilwit als de schedel, de halskraag en de schouderdeksels. Voorhelft der laatsten met eene breede donker grijsbruine streep. Thorax-rug grijsbruin.

Vleugels gevormd als bij *Piepersialis* (verg. de afb.). De grondkleur der voorvleugels is echter meer grauw dan omberbruin; men merkt dan ook in de kleur van den achterrand geen verschil op. Langs diens wortelzijde loopt, evenals bij *Piepersialis*, eene weinig smallere glanzig lichtpaarse streep. Cel 1*a* is langs den binnenrand tot drie vierden harer lengte, van af het adersprankje onder ader 1, vervolgens smaller, onzuiver wit; op twee vijfden is deze witte streep door een tand der grauwbruine grondkleur bijna afgebroken; daarachter ziet men een wit dwarsstreepje, dat tot ader 1 reikt. Aan den voorrand ziet men eerst eene zeer flauwe schuine lichtere lijn, dan eene even schuine spitse witte, aan den voorrand doffe, verder glanzige streep, tot in cel 1*b*. Zij is smaller dan dezelfde bij *Piepersialis*. Dwarsader met een fijn paars lijntje, daaronder (in cel 1*b*) eene fijne witte teekening als eene grieksche *v*. Vervolgens komt eene tweede spitse witte streep, die echter steiler is — even als bij *Piepersialis* — maar zij is veel smaller dan daar, niet breeder dan de eerste en zij heeft op het midden der buitenzijde een' grooten spitsen tand, die bijna zoo lang als het bovengedeelte der streep is. Langs de wortelzijde der lichtpaarse streep loopt eene fijne witte lijn, die echter tot aan den tand der

voorgaande witte streep dikker en getand is, wat niet het geval is bij *Piepersialis*. Zij is ook, behalve aan de spits van den tand, overal ver van de witte streep verwijderd. Franjelijn fijn wit, de franje geheel grijsbruin.

Achtervleugels als bij *Piepersialis*, maar het wit vuiler, met gelen glans en de donkere, half lichtpaarse en grijsbruine achterrand aan de wortelzijde slechts door eene — vooral van den voorraad tot ader 4 — zeer onduidelijke witte lijn en korte, fijne grijsbruine langslijntjes begrensd. Franjelijn wit, fijn grijsbruin gezoomd, de franje bruingrijs. Onderzijde der vleugels als boven gekleurd en geteekend, maar flauwer.

Achterlijf wit, op den rug bruingrijs, de staartpluim donker grijsbruin. Borst en pooten wit, de laatsten aan de buitenzijde iets donkerder bestoven.

De afbeelding van *Piepersialis* in het Tijdschrift is vrij goed; alleen is het bruin te donker en het paars op voor- en achtervleugels te rood. In kleur of teekening variëert deze soort niet.